



CHECKLIST IMPRIMABLE

Frelon asiatique : le mémo pratique pour reconnaître, s'éloigner et signaler sans risque

Ce PDF vous aide à faire le tri rapidement entre simple observation et vraie situation à risque. Gardez-le sous la main pour identifier le frelon asiatique, éviter les erreurs et adopter le bon réflexe en France.

Au sommaire

- 1 L'essentiel à retenir
- 2 Quand être le plus vigilant
- 3 Comparer pour éviter la confusion
- 4 Avant de vous approcher : vérification express
- 5 Que faire si un nid est suspecté

L'essentiel à retenir

Le frelon asiatique se repère surtout par son corps sombre, ses pattes jaunes et son abdomen marqué d'orangé.

En cas de présence suspecte, la bonne réponse est d'observer à distance puis de signaler sans intervenir.

Le risque principal apparaît surtout à proximité d'un nid ; un insecte isolé n'appelle pas la même réaction.

Le frelon asiatique exerce une forte pression sur les abeilles, surtout en fin d'été et en automne.

Quand être le plus vigilant

Le calendrier aide beaucoup à comprendre sa présence. Au printemps, la reine lance un premier nid souvent discret ; en été, la colonie grossit ; en fin d'été et en automne, l'activité devient plus visible et le risque autour des nids augmente. En hiver, la colonie disparaît en grande partie et seules les futures reines passent la mauvaise saison.

LE CYCLE SAISONNIER DU FRELON ASIATIQUE EN FRANCE

i À RETENIR

- Cycle annuel : de l'automne à l'automne suivant.
- Seules les reines fécondées passent l'hiver.
- Un nid actif meurt avec l'arrivée de l'hiver.
- La vigilance et le signalement des nids sont essentiels pour limiter l'impact sur la biodiversité et la sécurité.

1 REINES FÉCONDÉES

À l'automne, de nouvelles reines fécondées quittent le nid pour se mettre à l'abri et passer l'hiver. Elles sont seules et entrent en diapause.

2 PRINTEMPS

Au printemps, la reine fécondée sort de sa cachette et reprend son activité. Elle cherche un endroit abrité pour fonder son premier nid.

3 NID PRIMAIRE

La reine construit un petit nid primaire (taille d'une balle de tennis) et y pond ses premiers œufs. Elle élève seule les premières ouvrières.

4 CROISSANCE ESTIVALE

Les freloires prennent le relais : le nid grossit rapidement et la colonie se développe fortement au cours de l'été (plusieurs milliers d'individus).

5 NID SECONDAIRE EN HAUTEUR

La colonie déménage vers un nid secondaire, beaucoup plus volumineux, généralement situé en hauteur dans les arbres (jusqu'à 1 m de diamètre).

6 PRÉDATION SUR LES ABEILLES

Les frelons asiatiques chassent activement les abeilles et autres insectes pollinisateurs pour nourrir leurs larves, provoquant un stress important sur les colonies d'abeilles et la biodiversité.

7 AUTOMNE

À l'automne, la colonie atteint son pic d'activité. De nouveaux futurs reproducteurs (mâles et nouvelles reines) sont produits. Les reines fécondées quittent le nid pour se disperser.

8 HIVER

La reine fécondée passe l'hiver à l'abri, en repos. Au printemps suivant, un nouveau cycle recommencera.

EN CHIFFRES

- Taille d'un nid secondaire : jusqu'à 1 m de diamètre
- Population d'un nid en été : 1 000 à 5 000 individus
- Rayon d'action des ouvrières : jusqu'à 2 km autour du nid

ATTENTION

Le frelon asiatique est une espèce exotique envahissante. Sa piqûre peut être douloureuse et dangereuse pour les personnes allergiques.

SIGNELEZ LA PRÉSENCE D'UN NID SUR LA PLATEFORME OFFICIELLE :
www.frelonsasiatiques.fr

 Agissons ensemble : protégeons les abeilles, la biodiversité et adoptons les bons réflexes !

SCHEMA SAISONNIER Repérer les périodes où le frelon asiatique est le plus visible et où un nid peut se développer.

COMMENT RECONNAÎTRE LE FRELON ASIATIQUE

Des critères visuels simples pour l'identifier et adopter les bons réflexes.



1. OBSERVER À DISTANCE

Prenez le temps d'observer sans vous approcher pour repérer les caractéristiques suivantes :

2 THORAX SOMBRE
Le thorax est entièrement noir ou très foncé.



3 PATTES JAUNES
Les pattes sont jaunes à leur extrémité.



4 ABDOMEN SOMBRE AVEC ZONE ORANGÉE
L'abdomen est sombre avec une large bande orangée vers l'extrémité.



5 NID SPHÉRIQUE EN HAUTEUR



Le nid est souvent sphérique et situé en hauteur dans les arbres, à plus de 10 mètres du sol.

6 COMPARER AVEC LE FRELON EUROPÉEN

Le frelon asiatique (à gauche) se distingue du frelon européen (à droite) par plusieurs critères.

	FRELON ASIATIQUE (Vespa velutina)	FRELON EUROPÉEN (Vespa crabro)
Thorax	Entièrement noir ou très foncé	Brun-roux avec des marques
Pattes	Extrémités des pattes jaunes	Pattes brun-roux uniformes
Abdomen	Sombre avec une large bande orangée	Jaune avec des bandes noires
Aspect général	Globalement plus sombre et fin	Plus grand, plus trapu et plus coloré

7 NE PAS APPROCHER



Ne vous approchez jamais d'un nid ou des frelons.

Risque de piqûres multiples et dangereuses.



En cas d'observation d'un nid, contactez votre mairie ou les services compétents.



À RETENIR



Observez à distance et identifiez les critères.



Ne confondez pas avec le frelon européen.



Les nids sont en hauteur et souvent discrets.



Votre sécurité et celle des autres sont la priorité.

SCHEMA DE RECONNAISSANCE Comparer les critères utiles pour distinguer le frelon asiatique du frelon européen et de la guêpe commune.

Comparer pour éviter la confusion

Espèce	Repères utiles
Frelon asiatique	Plutôt sombre, thorax brun noir, pattes aux extrémités jaunes, abdomen sombre avec zone orangée ; nid souvent sphérique et en hauteur.
Frelon européen	Aspect plus clair, plus jaune et roux ; le nid est souvent dans une cavité ou un abri.
Guêpe commune	Jaune et noir très contrasté ; petit nid papier, parfois souterrain ou abrité.

Avant de vous approcher : vérification express



Observer à distance

Rester en sécurité et ne pas chercher à capturer l'insecte.



Repérer un va-et-vient répété

Des allers-retours au même endroit peuvent signaler un nid.



Vérifier la hauteur et la forme

Un nid sphérique ou ovoïde en hauteur doit attirer l'attention.



Éloigner les enfants et les animaux

Surtout si le passage est fréquent près d'une maison ou d'un jardin.



Ne pas tenter de destruction artisanale


Pas de secouage, pas de pulvérisation improvisée, pas d'approche pour filmer.



Signaler la présence

Prévenir la mairie ou le circuit local prévu dans votre secteur.

Que faire si un nid est suspecté



1 Reculer et sécuriser

Éloignez-vous calmement et évitez toute agitation près du nid présumé.

2 Délimiter la zone de passage

Ne restez pas sous l'arbre, sous l'avant-toit ou près du point d'activité repéré.

3 Transmettre l'information

Signalez la situation à la mairie ou au dispositif local en place dans votre commune.

4 Laisser intervenir des professionnels

N'essayez pas de retirer le nid vous-même, même s'il semble petit ou accessible.

! Après une piqûre : quand appeler en urgence

Appelez le 15 ou le 112 si la personne présente une gêne respiratoire, un malaise, un gonflement du visage, de la gorge ou de la langue, une réaction rapide et étendue, ou un antécédent d'allergie aux piqûres d'hyménoptères.

En cas de doute, privilégiez toujours la distance et le signalement local. Ce mémo ne remplace pas l'avis des secours en situation d'urgence.